МАТЕРИАЛЫ ВЫПУСКА «ЯКУТСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЖУРНАЛА»

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С.А. Чугунова, Т.Я. Николаева, Т.С. Егорова

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИМОЗГОВЫХ ГЕМАТОМ, АССОЦИИРОВАННЫХ С АНТИ- КОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИЕЙ

УДК 616.831

Проведено исследование с целью установления особенностей локализации внутримозговых гематом, ассоциированных с приемом антикоагулянтной терапии, в группах больных с варфарин-ассоциированными и спонтанными гипертензивными внутримозговыми гематомами. Установлено, что варфарин-ассоциированные гематомы характеризуются более частой локализацией в мозжечке в сравнении с гипертензивными внутримозговыми гематомами.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, внутримозговые гематомы, антикоагулянтная терапия, варфарин.

This study was provided to characterize the localization of intracerebral hematomas, associated with anticoagulant therapy, in patients with warfarin-associated and spontaneous hypertensive intracerebral hematomas. It is found that warfarin-associated hematoma is characterized by a common site in the cerebellum compared with hypertensive intracerebral hematomas.

Keywords: hemorrhagic stroke, intracerebral hematoma, anticoagulation therapy, warfarin.

Введение. В последнее время большую актуальность приобретает проблема геморрагического инсульта (ГИ), обусловленного состояниями изменения свертывающей системы крови на фоне постоянного приема антитромботической терапии. Возрастающий интерес к данной проблеме вызван тем, что в популяции увеличивается количество пациентов, которым назначается антикоагулянтная и антиагрегантная терапия с целью профилактики тромбэмболических событий. Прием антикоагулянтной терапии увеличивает риск ГИ [2, 21, 22]. Внутримозговые кровоизлияния (ВМК), ассоциированные с приемом антикоагулянтов, характеризуются повышенным риском экспансии гематомы, последующего клинического ухудшения и летального исхода [11]. Опубликованные данные об особенностях локализации внутримозговых гематом, ассоциированных с приемом антикоагулянтов, носят противоречивый характер [5, 17, 27]. В популяции Якутии исследований по изучению особенностей клинической картины геморрагического инсульта, возникшего на фоне меди-

каментозной гипокоагуляции, ранее не проводилось.

Цель исследования – установить особенности локализации внутримозговых гематом, ассоциированных с приемом антикоагулянтной терапии.

Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование 492 пациентов, последовательно госпитализированных в Региональный сосудистый центр Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи МЗ Республики Саха (Якутия) в период 2012-2014 гг. с диагнозом: геморрагический инсульт, острая стадия. Критерии включения в группу обследования: 1) пациенты с ВМК, возникшим на фоне антикоагулянтной терапии варфарином (варфарин-ассоциированные ВМК, ваВМК), поступившие в состоянии гипокоагуляции со значением международного нормализованного отношения (МНО) более 3,0 (1-я группа – 14 чел., 2,8% общего количества), и 2) пациенты с первичными спонтанными ВМК гипертензивной этиологии (2-я группа – 478 чел., 97,2%). В исследование не были включены пациенты с ВМК, возникшими в результате разрыва сосудистых аномалий головного мозга (артериальных аневризм, артерио-венозных мальформаций, кавернозных ангиом); травмы; кровоизлияния в опухоли; нарушений свертывающей системы крови вследствие заболеваний печени, крови, приема антиагрегантов, «новых антикоагу-

лянтов», гепарина, тромболитической терапии. Диагноз был подтвержден данными неврологического осмотра, анамнеза, нейровизуализацией (компьютерная томография головного мозга (КТ) и/или магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ)) в 100% случаев. Состояние коагулирующих свойств крови оценивалось по показателю МНО. Проводился анализ демографических данных, показателей МНО, локализации ВМК по данным нейровизуализации в обеих группах. По локализации гематомы были распределены следующим образом: супратенториальные гематомы (латеральной, медиальной, лобарной, смешанной локализации); гематомы мозжечка; стволые гематомы. В первой группе проводился анализ дозы антикоагулянта в дебюте заболевания, а также наличие факторов риска тромбэмболических событий по шкале CHADS₂; анализ риска геморрагических осложнений по шкале HAS-BLED.

Статистический анализ проводился с использованием пакетов компьютерных программ STATISTICA 8. Количественные признаки описывались медианами (Me) и квартилями [Q1; Q3]. Для сравнения центральных параметров групп использовался непараметрический метод U-критерий Манна-Уитни. Исследование взаимосвязи между парами дискретных качественных признаков проводилось с использованием анализа парных таблиц сопряженности. Помимо оценок точного критерия

Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова: **ЧУГУНОВА Саргылана Афанасьевна** – к.м.н., доцент, sarguc@mail.ru, **НИКОЛАЕВА Татьяна Яковлевна** – д.м.н., проф., зав. кафедрой, tyanic@mail.ru, **ЕГОРОВА Туяра Сергеевна** – врач невролог, клинический ординатор, labyrinth_of_december@mail.ru.

Фишера проводили анализ силы ассоциаций в значениях относительного риска (OR) с 95%-ным доверительным интервалом (CI).

Результаты исследования. Демографические и клинические характеристики обеих групп представлены в таблице. Средний возраст пациентов 1-й гр. составил 61,5 (57; 67) года (min – 42, max – 75). Пациенты мужского пола составили 57,1% (n=8). Во 2-й гр. средний возраст пациентов составил 59 (51; 66) лет (min – 16, max – 89) и не имел значимой разницы между обследуемыми группами (p=0,305). Доля пациентов мужского пола – 58,2% (n=278). В 1-й гр. (n=14) до развития ВМК антикоагулянтная терапия была назначена для профилактики тромбэмболических осложнений на фоне фибрилляции предсердий 10 пациентам (71,4%), на фоне протезированных клапанов сердца – 3 (21,4), на фоне сочетания фибрилляции предсердий и протезированного клапана сердца – 1 пациенту (7,1%). Из них сердечная недостаточность диагностирована у 12 пациентов (85,7%), артериальная гипертония – у 14 (100%), сахарный диабет – у 3 (21,4%). Пациентов в возрасте > 75 лет в 1-й гр. не было, перенесенный инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе (ТИА) были у 10 пациентов (71,4%). У больных с фибрилляцией предсердий оценка по шкале CHADS₂, равная 2 и > баллам, была в 100% случаев (n=10).

У пациентов 1-й гр. диагностированы следующие факторы риска геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии: артериальная гипертония – 100% (n=14), острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе – 71,4 (n=10), прием антикоагулянта без лабораторного контроля МНО – 42,8 (n=6), возраст > 65 лет – 35,7 (n=5), одновременный прием лекарственных средств (антиагреганты, неспецифические противовоспалительные средства) – 21,4 (n=3), злоупотребление алкоголем – 14,3 (n=2), наличие кровотечений в анамнезе – 7,1 (n=1), декомпенсированные заболевания печени, почек – по 7,1% (n= по 1 чел.). Таким образом, риск геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии по шкале HAS-BLED, равный 3 баллам и более, в преморбидном периоде до развития ВМК, был установлен в 71,4% случаев (n=10).

В 1-й гр. в 100% случаев (n=14) ваВМК возникло на фоне медикаментозной гипокоагуляции варфарином. Пациенты, получавшие варфарин, поступили в состоянии гипокоагуляции

Демографическая и клиническая характеристика внутримозговых гематом (1-я гр.), ассоциированных с приемом антикоагулянтной терапии, и спонтанных гипертензивных внутримозговых гематом (2-я гр.)

	Первая группа	Вторая группа	p*, OR (95 % CI)
n	14	478	
Мужской пол, n (%)	8 (57,1)	278 (58,2)	
Возраст, лет	61,5 [57; 67]	59 [51; 66]	p = 0,305
МНО > 3, n (%)	14 (100)	-	
CHADS ₂ , 2 и > баллов, n (%)	14 (100)	-	
HAS-BLED 3 и > баллов, n (%)	10 (71,4)	-	
Локализация гематом:			
- супратенториальная, n (%)	9 (64,3)	407 (85,1)	p = 0,05; OR = 0,314; 95% CI: 0,093 – 1,113
- мозжечковая, n (%)	4 (28,6)	33 (6,9)	p = 0,017; OR = 15,39; 95% CI: 1,398 – 20,144
- стволовая, n (%)	1 (7,1)	38 (7,9)	p = 1,00; OR = 0,89; 95% CI: 0,042 – 6,826
Объем гематом, см ³	25,5 [6,0; 45,0]	22,3 [8,0; 80,0]	p = 0,857
Прорыв крови в желудочки мозга, n (%)	7 (50)	150 (31,4)	p = 0,153

*По двустороннему критерию Фишера.

с показателем МНО>3,0 в 14 случаях (100%), в том числе: с показателем МНО от 3,0 до 5,0 включительно – в 8 (57,1% от общего количества пациентов), с МНО>5,0 – в 6 случаях (42,8%). Минимальный показатель МНО – 3,18; максимальный – 12,54. Доза варфарина на момент дебюта ваВМК составила 5 мг и менее у 13 пациентов (92,9%), более 5,0 мг – у 1 (7,1%). Во 2-й гр. МНО<3 был в 100% случаев (n=478). В 2 случаях (14,8%) ГИ сочетался с экстракраниальными кровоизлияниями, в том числе с макрогематурией, с желудочным кровотечением – по 7,1% (n= по 1 чел.). В остальных случаях (85,7%, n=12) заболевание проявилось только церебральными осложнениями.

В 1-й гр. по локализации гематомы распределились следующим образом: супратенториальные гематомы диагностированы у 9 пациентов (64,3%), гематомы мозжечка – у 4 (28,6), стволовые гематомы – у 1 (7,1%). Во 2-й гр. супратенториальные гематомы диагностированы в 407 случаях (85,1%), мозжечковые гематомы – в 33 (6,9), стволовые – в 38 (7,9). Сравнительный анализ частоты локализаций гематом между 1-й и 2-й гр. показал, что частота гематом мозжечка была выше в 1-й гр. (28,6% против 7,1%) (p=0,017; OR=15,39; 95% CI: 1,398 – 20,144). Частота гематом стволовой локализации не имела значимых различий между двумя группами (7,1% против 7,7% (p=1,00; OR=0,89; 95% CI: 0,042 – 6,826)), так же, как и частота гематом супратенториальной локализации (64,3% против 85,1% (p = 0,05; OR=0,314; 95% CI: 0,093 – 1,113)).

Средний объем гематом в 1-й гр. со-

ставлял 25,5 см³ (6,0; 45,0) (min – 1,8; max – 150,0). Во 2-й гр. средний объем гематом составил 22,3 см³ (8,0; 80,0) (min – 1,0; max – 196,0). Значимых различий в объеме гематом не было установлено (p=0,857). Прорыв крови в желудочковую систему мозга диагностирован в 1-й гр. в 7 случаях (50%), во 2-й гр. – в 150 случаях (31,4%) и не имел значимой разницы между исследуемыми группами (p = 0,153).

Обсуждение. Мы провели исследование особенностей локализации ВМК, возникших на фоне приема антикоагулянтной терапии, в сравнении со спонтанными гипертензивными ВМК, являющимися наиболее частым типом ГИ. На долю первичных спонтанных ВМК приходится подавляющее большинство (до 88% общего числа ВМК) [3, 20, 23]. К первичному ВМК относят гематомы, которые происходят за счет разрыва мелких сосудов, поврежденных хронической артериальной гипертонией или амилоидной ангиопатией [20].

Эффективность непрямых антикоагулянтов для профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий намного выше, чем эффективность антиагрегантов (снижение риска заболевания на 64 и 22%, соответственно) [14]. Однако антикоагулянтная терапия варфарином, эффективно снижая риск развития ишемического инсульта, связанного с фибрилляцией предсердий, увеличивает риск больших кровотечений [7, 16, 26]. Особенно актуальна проблема ГИ, ассоциированного с антикоагулянтной терапией. В исследовании [21] изучены факторы риска ВМК в группе из 597 пациентов. Установлено, что прием варфарина

является фактором риска развития заболевания (OR=4,63; CI 95%: 3,17 – 6,76; $p < 0,001$). При этом прием данного препарата является фактором риска как лобарного (OR=5,23; CI 95%: 2,88 – 9,50; $p < 0,001$), так и нелобарного ВМК (OR=4,24; CI 95%: 2,6 – 6,94; $p < 0,001$). Частота геморрагических осложнений в виде развития ВМК при приеме «новых» антикоагулянтов (дабигатрана и апиксабана), меньше, чем при приеме варфарина [6, 8, 9, 15]. Предикторами геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии являются предшествующий ишемический инсульт, артериальная гипертензия, наличие лейкоареоза, период инициации терапии варфарином, выраженная гипокоагуляция, а также использование антитромбоцитарной терапии совместно с антикоагулянтами [11, 13, 22]. Кроме того, носители определенных вариантов генов CYP2C9 и VKORC1 обладают повышенной чувствительностью к варфарину [18]. В исследовании [1], проведенном в группе пациентов с инсультом в Якутии, было показано, что носители генотипов VKORC1 и CYP2C9, определяющих повышенную чувствительность к варфарину, составили 40% обследованных. Пожилой возраст увеличивает риск кровотечений, особенно риск внутримозговых кровоизлияний [4]. В нашем исследовании средний возраст пациентов 1-й гр. был несколько выше (61,5 года), чем во 2-й гр. (59 лет), но данные различия не были значимыми ($p=0,305$).

Согласно данным нашего исследования, применение в преморбидном периоде антикоагулянтной терапии пациентами 1-й гр. было целесообразно в связи с тем, что варфарин назначался больным с протезированными клапанами сердца и больным с фибрилляцией предсердий, имеющим оценку по шкале CHADS₂, равную 2 и более баллов – в 100% случаев. С другой стороны, риск кровотечений по шкале HAS-BLED, равный 3 и более баллов, был установлен у 71,4% пациентов 1-й гр. Это свидетельствует о том, что в 1-й гр. не проводился контроль корригируемых факторов риска геморрагических осложнений. Так, согласно данным нашего исследования, у 42,8% пациентов 1-й гр. не проводился лабораторный контроль уровня МНО, у 21,4 – зарегистрирован одновременный прием варфарина с антиагрегантами или неспецифическими противовоспалительными средствами, у 14,3% – злоупотребление алкоголем. Неадекватный контроль уровня МНО

является фактором риска ВМК, ассоциированных с приемом антикоагулянтов [11].

Ассоциированные с приемом антикоагулянтов ВМК составляют, по разным источникам, от 5 до 20% всех случаев внутримозговых кровоизлияний [10, 11, 25]. Относительно небольшая (2,8%), по сравнению с данными других исследований, доля ваВМК в нашем исследовании, вероятно, объясняется тем, что в популяции Якутии количество пациентов, постоянно принимающих антикоагулянтную терапию с целью профилактики тромбоэмболических осложнений, в настоящее время невелико. Другим возможным объяснением данного феномена является то, что МНО у большей части данных пациентов не достигает «терапевтического» уровня гипокоагуляции. Таким образом, необходимо продолжить изучение ассоциации приема антикоагулянтной терапии как с уровнем геморрагических внутримозговых осложнений, так и с инсультами кардиоэмболического генеза. Доля пациентов, получающих варфарин и не имеющих рекомендуемых уровней МНО, довольно велика и по данным зарубежных исследователей. Так, согласно исследованию [19], проведенному в популяции США, среди 5210 пациентов с фибрилляцией предсердий, получающих варфарин, только 59% имели уровень МНО в пределах от 2,0 до 3,0, при этом доля тех, у кого данный показатель был выше рекомендуемых уровней, составила 17, у кого ниже – 10% от общего количества пациентов.

В настоящее время опубликованы данные небольшого количества исследований, посвященных изучению особенностей клинической картины ВМК на фоне медикаментозной гипокоагуляции. В сравнении с другими видами ГИ данное заболевание характеризуется повышенным риском экспансии гематомы, а также большим риском последующего клинического ухудшения и летального исхода [11, 12]. Данные об особенностях локализации ВМК на фоне приема антикоагулянтов носят противоречивый характер. По мнению разных авторов, гипокоагуляция на фоне антикоагулянтной терапии способствует развитию гематом стволовой, мозжечковой, лобарной, таламической локализации [5, 17, 27]. По данным исследования [15], проведенного в группе из 18113 пациентов с фибрилляцией предсердий, в течение 2 лет произошло 154 внутримозговых кровоизлияния, из них 46% ВМК, 45 –

субдуральных гематом и 8% субарахноидальных кровоизлияний. В исследовании [5] были проанализированы факторы риска мозжечковых ВМК. У 327 последовательно госпитализированных пациентов данная локализация ВМК была диагностирована в 38 случаях (12%). В 75% случаев мозжечковые ВМК возникли на фоне терапии варфарином с показателем МНО > 2,5 ($p < 0,0001$). Терапия варфарином с МНО > 2,5 и повышение уровня глюкозы в крови при госпитализации были независимо связаны с мозжечковыми ВМК по сравнению с гематомами других локализаций. Кроме того, ишемический инсульт в анамнезе ($p=0,002$) и заболевания сердца ($p=0,018$) были более распространены у пациентов с гематомами мозжечка в сравнении с пациентами с гематомами других локализаций. Авторы сделали вывод, что терапия варфарином с МНО > 2,5 ассоциирована с развитием гематом мозжечковой локализации. В работе [27] проведено исследование в группе из 404 последовательно госпитализированных пациентов с ВМК, из которых 69 получали варфарин. Пациенты, получавшие варфарин, имели большие объемы гематомы (медиана 23,9 мл против 14,2 мл, $p=0,046$). При этом в случаях гипокоагуляции с МНО > 3,0 частота ВМК стволовой локализации была выше в сравнении с пациентами, у которых показатель МНО был в терапевтическом диапазоне (24,0% против 6,1%; $p=0,005$). Таким образом, был сделан вывод, что пациенты с ваВМК имеют склонность к стволовой локализации гематомы. В исследовании [17] ретроспективно проанализированы 484 случая ВМК, из них антитромботическая терапия в преморбидном периоде была у 116 пациентов, в том числе 38 пациентов принимали варфарин, 70 пациентов – антиагреганты, 8 пациентов – одновременно оба препарата. Остальные 368 пациентов не получали антитромботической терапии. Антитромботическая терапия была независимым фактором риска развития мозжечковых (OR=3,66, 95% CI: 1,31–10,18), лобарного (OR=2,27, 95% CI: 1,12–4,57) и таламического кровоизлияний (OR=2,20, 95% CI: 1,06–4,54) по сравнению с путаменальным кровоизлиянием.

В настоящем исследовании мы разделили ВМК на три подгруппы: гематомы супратенториальной локализации, к которым отнесли медиальные, латеральные, лобарные и смешанные гематомы, локализующиеся в больших

полушариях головного мозга; стволовые гематомы и гематомы мозжечка. Было проведено сравнение частоты локализации гематом в сравнении с группой пациентов с самой часто встречающейся формой ГИ – спонтанными ВМК. Большинство первичных спонтанных ВМК (70%) локализируются в базальных ганглиях и таламусе, 13 – в стволе, 10 – в различных долях мозга, 9% – в мозжечке [24]. В нашем исследовании у пациентов, получавших варфарин, частота гематом мозжечка была значимо выше в сравнении с пациентами с гипертензивными ВМК ($p=0,017$; $OR=15,39$; 95% $CI:1,398 - 20,144$). Полученные данные согласуются с данными исследования [5], авторы которого установили, что при варфарин-ассоциированных гематомах мозжечковая локализация гематом встречается чаще, чем при ГИ другой этиологии. Кроме того, такая закономерность, как и в нашем исследовании, была установлена у пациентов, госпитализированных в состоянии гипокоагуляции вне терапевтического диапазона [5].

Наше исследование имеет ограничения. В обследованной группе количество наблюдений варфарин-ассоциированных ВМК невелико ($n=14$), что, вероятно, обусловлено небольшой долей ВМК данной этиологии в общей структуре ГИ в Якутии. Кроме того, в исследование не включены ВМК, ассоциированные с другими типами медуллярной гипокоагуляции. Необходимо дальнейшее исследование особенностей ВМК, возникающих на фоне гипокоагуляции. Установленные особенности локализации в ВМК представляют интерес вследствие того, что большая частота мозжечковых гематом, возникающих на фоне гипокоагуляции, вероятно, может быть обусловлена недостаточно изученными патофизиологическими механизмами геморрагического инсульта.

Заключение. Таким образом, в проведенном исследовании установлено, что внутримозговые гематомы, возникшие вследствие гипокоагуляции на фоне приема антикоагулянтов, характеризуются более частой локализацией в мозжечке по сравнению с гипертензивными гематомами ($p=0,017$; $OR=15,39$; 95% $CI:1,398-20,144$). В обследованной группе в 71,4% случаев геморрагический инсульт возник у лиц с высоким риском геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии с оценкой по шкале HAS-BLED, равной 3 и более баллам. Необходимы даль-

нейшие исследования ассоциации приема различных видов антикоагулянтной терапии с риском геморрагического инсульта в популяции Якутии.

Литература

1. Полиморфизмы генов VKORC1 и CYP2C9, влияющих на чувствительность к антикоагулянтной терапии, у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения / С.А. Чугунова, Т.Я. Николаева, А.Л. Данилова [и др.] // Якутский медицинский журнал. – Т. 2 (46). – 2014. – С. 64–67.
2. The gene polymorphism of CYP2C9 and VKORC1, affect the sensitivity to anticoagulant therapy in patients with acute ischemic stroke / S.A.Chugunova, T.Ya.Nikolaeva, A.L. Danilova [et al.] // Yakut Medical Journal. – V. 2 (46). – 2014. – P. 64 - 67.
3. Скворцова В.И. Геморрагический инсульт: практ. руководство / В.И. Скворцова, В.В. Крылов; под ред. В.И. Скворцовой, В.В. Крылова. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2005. – 155 с.
4. Skvortsova V.I. A hemorrhagic stroke: practical guide / V.I.Skvortsova, V.V.Krylov; ed. V. I. Skvortsova, V.V.Krylov. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2005. – 155 p.
5. Тул Д. Ф. Сосудистые заболевания головного мозга: руководство для врачей; пер. с англ. / Д. Ф. Тул.; под ред. Е. И. Гусева, А. Б. Гехт. 6-е изд. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2007. – 608 с.
6. Toole J.F. Cerebrovascular disease: practical guide; trans. from English. / J. F. Toole; ed. E.I.Gusev, A.B. Hecht. 6th ed. – М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2007. – 608 p.
7. Age and the Risk of Warfarin Associated Hemorrhage: The Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation Study / M. C. Fang, A.S. Go, E.M. Hylek [et al.] // J Am Geriatr Soc. – 2006. – V. 54 (8). – P.1231-1236. // Doi: 10.1111 / j.15325415.2006.00828.
8. Antithrombotic therapy and predilection for cerebellar hemorrhage / K. Toyoda, Y. Okada, S. Ibayashi [et al.] // Cerebrovasc Dis. – 2007. – V. 23 (2-3). – P. 109 - 116.
9. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation / C.B. Granger, J.H Alexander, J.J. McMurray [et al.] // N Engl J Med. – 2011. – V.365. – P.981 - 992.
10. Bleeding complications of oral anticoagulant treatment: An inception cohort, prospective collaborative study (ISCOAT) / G. Palareti, N. Leali, S. Coccheri [et al.] // Lancet. – 1996. – V. 348. – P.423 - 428.
11. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomized trials / C.T. Ruff, R.P. Giugliano, E. Braunwald [et al.] // Lancet. – 2014. – V. 383. – P. 955 - 962.
12. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation / S. J. Connolly, M. D. Ezekowitz, S.Yusuf [et al.] // N Engl J Med. – 2009. – V. 361. – P.1139 - 1151.
13. Effect of warfarin on intracranial hemorrhage incidence and fatal outcomes / D. M. Witt, T. Delate, E. M. Hylek [et al.] // Thrombosis Research. – 2013. – V.132. – P. 770 - 775.
14. Flaherty M.L. Anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage / M.L. Flaherty // Semin Neurol. – 2010. – V. 30 (5). – P. 565- 572. // doi: 10.1055 / s-0030-1268866.

12. Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage / J.C. Hemphill, S. M. Greenberg, C.S. Anderson [et al.] // Stroke. – 2015. – V. 46. – P. 2032 - 2060.
13. Hart R.G. Avoiding central nervous system bleeding during antithrombotic therapy: recent data and ideas [Text] / R.G. Hart, S.B. Tonarelli, L.A. Pearce // Stroke. – 2005. – V. 36 (7). – P. 1588 -1593.
14. Hart R.G. Meta-analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation / R.G. Hart, L.A. Pearce, M.I. Aguilar // Ann. Intern Med. – 2007. – V.146 (12). – P.857 - 867.
15. Intracranial hemorrhage in atrial fibrillation patients during anticoagulation with warfarin or dabigatran: the RE-LY trial / R.G. Hart, H.C. Diener, S. Yang [et al.] // Stroke. – 2012. – V. 43 (6). – P. 1511-1517. // Doi: 10.1161 / STROKEAHA.112.650614.
16. Landefeld C.S. Major bleeding in outpatients treated with warfarin: Incidence and prediction by factors known at the start of outpatient therapy / C.S. Landefeld, L. Goldman // Am J Med. – 1989. – V.87. – P.144 - 152.
17. Location of acute brain hemorrhage in patients undergoing antithrombotic therapy / R. Itabashi, M. Yasaka, T. Kuwashiro [et al.] // J Neurol Sci. – 2009. – V. 280 (1-2). – P. 87 - 89. // doi: 10.1016 / j.jns.2009.02.304.
18. Meschia J.F. Advances in genetics in 2010 / J.F. Meschia // Stroke. – 2011. – V.42. – P. 285 - 287.
19. Patients' time in therapeutic range on warfarin among US patients with atrial fibrillation: Results from ORBIT-AF registry / S.D. Pokorney, D.N. Simon, L. Thomas [et al.] // Am Heart J. – 2015. – V. 170 (1). – P.141- 148. // doi: 10.1016 / j.ahj.2015.03.017
20. Qureshi A. I. Spontaneous intracerebral hemorrhage [Text] / A. I. Qureshi, S. Tuhim S, J. P. Broderick [et al.] // New England Journal of Medicine. – 2001. – Vol. 344. – P. 1450 - 1460.
21. Risk factors for intracerebral hemorrhage differ according to hemorrhage location / S.R. Martini, M.L. Flaherty, W.M. Brown [et al.] // Neurology. – 2012. – V.79 (23). – P. 2275 - 2282. // doi: 10.1212 / WNL.0b013e318276896f
22. Steiner T. Intracerebral hemorrhage associated with oral anticoagulant therapy: current practices and unresolved questions / T. Steiner, J. Rosand, M. Diringer // Stroke. – 2006. – V. 37 (1). – P.256 - 262.
23. Stroke: Pathophysiology, Diagnosis and Management / Ed. H. J. M. Barnett, J. P. Mohr, B. M. Stein, F. M. Yatsu. Second Edition. – New York, «Churchill Livingstone»: 1992. – 1270 p.
24. The Harvard Cooperative Stroke Registry: a prospective registry [Text] / J. P. Mohr [et al.] L. R. Caplan, J. W. Melski [et al.] // Neurology. – 1978. – Vol. 28. – P. 754.
25. The increasing incidence of anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage [Text] / M.L. Flaherty, B. Kissela, D. Woo [et al.] // Neurology. – 2007. – V. 68 (2). – P. 116-121.
26. The risk for and severity of bleeding complications in elderly patients treated with warfarin [Text] / S.D. Fihn, C.M. Callahan, D.C. Martin [et al.] // Ann Intern Med. – 1996. – V.124. – P. 970 - 979.
27. Warfarin-associated intracerebral hemorrhage: volume, anticoagulation intensity and location [Text] / M. Ma, A. Meretoja, L. Churilov [et al.] // J Neurol Sci. – 2013. – V. 332 (1-2). – P.75 - 79. // doi: 10.1016 / j.jns.2013.06.020.